

エコライフ通信

No.101



2024年11月発行

真ごころのサービスネットワーク
株式会社 工藤燃料

■LPガス ecoplus
■灯油
■住宅関連機器
■住宅リフォーム

☎0144-55-0228 【営業時間】08:30~17:00
【定休日】日曜日・祝日

苫小牧市沼ノ端中央3丁目15番11号 エコジョーズ 工藤燃料

❀ 年末年始休業のお知らせ ❀

12月30日(月)	休	業
12月31日(火)	休	業
令和7年1月1日(水)	休	業
1月2日(木)	休	業
1月3日(金)	休	業
1月4日(土)	午前のみ営業	
1月5日(日)	休	業
1月6日(月)	より通常営業	

灯油のご注文は、
余裕をもって
お早めに!!



緊急時のご連絡は、
0144-76-3399 へ

プロパンガス価格について
11月の検針より 1m³ 10円
値下げさせていただきます

今月の灯油価格 (11月1日 現在)
1リットル = 112円 (消費税別)
123.2円 (消費税込)

※ 急な価格変更がある場合がございます



❄️ 水道の凍結にご注意ください ❄️

昼夜関係なく
「最低気温が-4℃以下の時」「水道凍結指数[※]が高まる時」は、
水道凍結の恐れがあります。
12月~2月の間 日中でも氷点下の真冬日は特に注意です。
水道管が破裂する事もありますので、凍結防止対策をしましょう。

※ 冬場の強い冷え込みで発生する「水道凍結」について注意を知らせる指数です
天気予報などで確認できます

- ・ 冬季間は、床下換気口を閉じて冷たい風が入らないようにしてください。
- ・ おやすみ前には水落としをしてください。
- ・ 長期不在にする時は、水落とし(トイレなどは不凍液の投入)を忘れずに。
- ・ 屋外の水道は、早めに水落としをしておきましょう。

凍結した水道管の解氷・修理は 当社ではおこなっておりません。
お住まいの自治体の指定水道修理業者へ連絡してください。

ポータブル石油ストーブを 毎シーズン正しくお使い頂けていますか？

誤った使い方をしてしまうと、火災や燃焼中・消火直後の高温部でのやけどなどのケガ、一酸化炭素中毒などの事故につながる恐れがあります。

- 給油後は、必ず消火し、間違いなく 灯油を給油してください。
- 給油後のタンクの口金が確実に閉まっているか確認してください。
- 1時間に1～2回程度換気を行ってください。
- スプレー缶やカセットボンベをストーブの近くに置くのは × !!
- 洗濯物、布団、カーテン、新聞などの可燃物の近くでの使用も × !!
- 就寝時・外出時は必ず消火の確認を。
- 小さいお子様、お年寄り、病気の方がいるご家庭は十分に注意してください。
- ポータブル石油ストーブの換気の日安としては、1時間ごとに1～2回、約5～10分程度おこなうのがよいでしょう。
- 機器の異常を感じたら使用を中止し、点検を依頼してください。

石油ストーブ以外にも一酸化炭素中毒は起こります。

・・・湯沸かし器・・・

不完全燃焼防止装置のない湯沸かし器や、経年劣化による故障などで、一酸化炭素を発生させることがあります。

なかでも、燃焼ガスを室内に放出する室内開放型の湯沸かし器は注意が必要です。古い年代の器具だと不完全燃焼防止装置が取り付けられていないこともあります。業者に点検してもらい、湯沸かし器に問題がないかを確認しておきましょう。

・・・ガスコンロ・・・

経年劣化している器具は不完全燃焼の危険性も高まっているため、定期的に業者に点検を依頼するとよいでしょう。

ガスコンロの炎は普段**青色**です。不完全燃焼を起しているときは**赤色**や**オレンジ色**になります。使用中に炎の色が変わっているのに気づいたら、すぐに炎を消し換気をしてください。

石油ストーブの換気も大切ですが、湯沸かし器やガスコンロも換気は必須です。

- ★ 換気扇をまわす
- ★ サーキュレーターを使用する
- ★ 空気の道を作ってすばやく換気
- ★ 部屋の対角線上の窓を開ける
- ★ 高低差のある窓を開ける

など、使用中は換気を心がけるようにしましょう。

一酸化炭素中毒とは…

一酸化炭素は、不完全燃焼を起こすことで発生します。酸素が不足している状態で燃焼が起きますと不完全燃焼になり、一酸化炭素が発生します。一酸化炭素は無色・無臭で、大変毒性が強いという性質をもっています。発生が分かりにくく、ほんの少しでも吸い込むと、中毒症状により死に至る恐れがある大変危険なガスです。

空気中の一酸化炭素濃度と中毒症状

一酸化炭素濃度……………症状

約0.02% …………… 2～3時間以内に軽い頭痛がします。

約0.04% …………… 1～2時間で前頭痛、2.5～3.5時間で後頭痛の症状が出ます。

約0.08% …………… 45分で頭痛、めまいや吐き気の症状が出て、2時間で失神します。

約0.16% …………… 20分で頭痛、めまいや吐き気の症状が出て、2時間で失神します。

約0.32% …………… 5～10分で頭痛やめまいの症状が出て、30分で死亡します。

約0.64% …………… 1～2分で頭痛やめまいの症状が出て、10～15分で死亡します。

約1.28% …………… 1～3分で死亡します。

